



BUCOGLOBIN® NF SOLUCIÓN

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0,12%

Venta libre en condiciones reglamentarias
Industria uruguaya

Solución

FÓRMULA

Cada 100 ml. contiene:
Clorhexidina digluconato0,12 g
Excipientesc.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Desinfectante, antibacteriano bucofaríngeo.

El gluconato de clorhexidina solución se usa para el tratamiento de gingivitis caracterizada por inflamación de las encías y para la prevención de formación de placas de sarro.

Posee propiedades astringentes, antiinflamatorias y vasoconstrictoras.

INDICACIONES Y USOS

- Gingivitis, inflamación y sangrado de encías, necrosis ulcerativa.
- Infecciones bucales, luego de intervenciones quirúrgicas.
- Tratamiento de estomatitis, clorhexidina se usa en el tratamiento de inflamación de la mucosa bucal causada por asociación de hongos y bacterias.
- Aftas.
- Reducción de placas dentales.

Es efectivo para combatir el mal aliento.

CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

Intolerancia a la clorhexidina.

El producto es incompatible con boratos, cloruros, citratos, fosfatos, sulfatos y surfactantes aniónicos.

PRECAUCIONES

No se han realizado estudios apropiados en niños menores de 18 meses de edad.

No se han reportado problemas específicos en ancianos con el uso de clorhexidina.

En presencia de relleno de dientes frontales, las superficies rugosas o los márgenes pueden desarrollar una decoloración permanente.

EFFECTOS ADVERSOS Y SECUNDARIOS

Algunos pacientes desarrollan una alteración en la percepción del gusto en los tratamientos con clorhexidina, efecto que resulta notorio solamente con un tratamiento continuo. No se han reportado casos de alteración permanente en el gusto.

Excepcionalmente puede aparecer una coloración amarillenta en la dentadura que desaparece con el mismo cepillado.

POSOLOGÍA

La terapia con clorhexidina solución debe comenzarse luego de una profilaxis dental.

Su acción protectora se extiende durante 12 horas fijándose a nivel dental y en las mucosas.

MODO DE EMPLEO

Realizar buches o enjuague bucal por la mañana y por la noche con BUCOGLOBIN® NF SOLUCIÓN sin diluir durante 30 segundos. Para desinfección bucofaríngea realizar gárgaras, sin ingerir el producto, hasta 6 veces por día.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente (menor a 25° C).

PRESENTACIÓN

Envases con 250 ml.

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Gador 
Al Cuidado de la Vida

Gador

Laboratorio Gador S.A. N° 342
La Paz 2257 - Montevideo
Tel. 2401 64 44* - Fax: 2401 18 51
D.T. Quím. Farm. Christian Díaz
Reg. M.S.P. N° 42863 - Ley 15443

32156-004

