



VENOSTASIN® RETARD

EXTRACTO SECO DE SEMILLAS DE AESCULUS HIPPOCASTANUM L.

Control médico recomendado
Industria uruguaya

Cápsulas con microgránulos
de liberación prolongada

COMPOSICIÓN

Cada cápsula de VENOSTASIN® RETARD con microgránulos de liberación prolongada contiene:
Extracto seco de semillas de *Aesculus hippocastanum* L. (Castaño de la India)

correspondiendo a Escina 50 mg
Excipientes C.S.

INDICACIONES

Alivio temporal (de dos a tres meses) de síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve de las extremidades inferiores, tales como dolores, sensación de pesadez, hormigueo, calambres nocturnos y prurito en piernas con varices.
VENOSTASIN® RETARD está indicado en adultos.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Posología

Adultos

1 cápsula dos veces al día, equivalente a 100 mg de escina diarios, sin masticar con un poco de líquido.
La duración recomendada del tratamiento es de 4 a 8 semanas.

Población pediátrica

No administrar a niños y adolescentes menores de 18 años.

Forma de administración

Vía oral

Las cápsulas deben ser ingeridas enteras, sin masticar y con abundante agua.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No se debe aumentar la dosis diaria recomendada.

No administrar más de 4-8 semanas seguidas, salvo mejor criterio médico. Si los síntomas persisten después de 8 semanas, o empeoran, a pesar de dosificación suficiente e ingestión regular, se debe evaluar la situación clínica.

Se recomienda la utilización de vendas elásticas o medias de compresión como coadyuvante al tratamiento con este medicamento.

Se recomienda evaluar la situación clínica del paciente, cuando, al administrar el producto, en los casos de problemas causados por varices en una o ambas piernas, se manifestara una reacción súbita que se caracteriza por aparición de edema, coloración de la piel o sensaciones de tensión, calor o dolor severo, úlceras, insuficiencia cardíaca o renal, ya que pueden ser síntomas de una enfermedad grave.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

No se han descrito.

Fertilidad, embarazo y lactancia

La seguridad durante el embarazo y la lactancia no se ha establecido.

En ausencia de datos suficientes, el uso durante el embarazo y la lactancia no está recomendado.

No se han realizado estudios sobre la influencia en la fertilidad.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No se han llevado a cabo estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

REACCIONES ADVERSAS

Molestias gastrointestinales, cefalea, vértigo y reacciones alérgicas (como picor) han sido comunicados. La frecuencia no es conocida.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se conocen casos de sobredosificación con el extracto hasta la fecha, sin embargo en casos de ingestión accidental de cantidades grandes o de sobredosificación se debe enviar al paciente a un centro médico y realizar lavado gástrico y administrar tratamiento sintomatológico.

Después de la administración intravenosa de escina pura en dosis muy elevada, se han observado casos de fallo renal agudo.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Toxicología (CIAT), tel. 1722.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10, 20 y 30 cápsulas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco.

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

